

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Clasificación Toxicológica: Clase III. - Ligeramente peligroso. - (IPCS/OMS 2004).
Antídotos: No tiene.
Primeros Auxilios: **En caso de ingestión:** provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta.
Contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos.
Contacto con la piel: quitar las ropas contaminadas y lavar con abundante agua.
En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.
Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. El local debe estar claramente señalado.

Toxicidad para abejas: Dada la modalidad de uso, no tóxico.
Disposición final de envases: Perfore el envase para evitar su reutilización. Los envases inutilizados deben ser trasladados al centro de recolección mas cercano. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.
No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Lea atentamente la etiqueta (y el folleto adjunto, si existe) antes de usar el producto.
En caso de intoxicación, llamar al CIAT Telef.: (02)1722. Concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.
No debe usarse para tratar granos destinados a alimentación humana o animal, ni para industrialización. El lavado no elimina el tóxico de la semilla tratada.

NOTA: Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera del control de esta firma, esta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por entendido, que el comprador ha aceptado estas condiciones.

ENVION CT 25/25 CURASEMILLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA

PRINCIPIO ACTIVO	Porcentaje en peso	Concentración
TMTD	21,6%	250 g/l
CARBENZADIM	21,6%	250 g/l

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo:
TMTD: Ditiocarbamato. Carbendazim: Bencimidazol

Número de Registro: 2750
Número del lote o partida:
Fecha de fabricación:
Fecha de vencimiento:
Nombre del fabricante o formulador: ENZUR S.A.
Formulacion nacional



Empresa registrante: **CALISTER S.A.**
Dorado (Ex Oficial 2) N° 84 Aeropuerto de Carrasco
Canelones - Uruguay
Tel.: (598 2) 600 9903* / Fax (598 2) 604 5879
E-mail: calister@calister.com.uy / www.calister.com.uy
Servicio de Atención al Cliente 0800-1827

AGITAR ANTES DE USAR

Cont. Neto: **20** Litros

USO AGRÍCOLA

Empresa con su Sistema de Gestión de Calidad(SGC) certificado según normas ISO 9001:2000 en todos sus procesos y servicios por LATU SISTEMAS/ QUALITY AUSTRIA

RECOMENDACIONES DE USO:
Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo e instrucciones de uso: ENVIÓN CT 25/25 es un curasemilla compuesto por un fungicida sistémico y otro de contacto, de muy buena suspensibilidad y fácil aplicación, indicado para el control de las enfermedades que figuran en la etiqueta.

CULTIVO DE SEMILLA	ENFERMEDAD		DOSIS por 100 kilos
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	
CEBADA	Mancha Borrosa Mancha en red	Bipolaris sorokiniana Drechslera teres	200 cc 200 cc
CEBADA + TRIGO	Helmintosporiosis Podredumbre de plántulas	Bipolaris sorokiniana Fusarium graminearum	200 cc 200 cc
TRIGO	Carbón volador Carbón hediondo	Ustilago nuda Tilletia foetida	200 cc 200 cc
SOJA	Cercoporiosis Fusariosis Antracnosis	Cercospora soja Fusarium sp. Colletotrichum truncatum	250 cc 250 cc 250 cc
ARROZ	Enfermedades de la semilla	Fusarium sp. Helminthosporium oryzae	200 - 250 cc 200 - 250 cc

Compatibilidad y Fitotoxicidad:
Como no es posible predecir con cuales productos se combinará Envión CT 25/25, se debe efectuar una prueba previa en pequeña escala, antes de utilizar cualquier tipo de mezcla a campo. Es compatible su uso con inoculantes para soja, respetando las indicaciones de uso de las etiquetas de los inoculantes. Inocular posteriormente a la aplicación con el curasemilla ENVIÓN CT 25/25.

Modo de preparación y técnica de aplicación:
Se aplica directamente a la semilla previo a la siembra. Una sola vez, y diluido en una cantidad suficiente de agua de tal forma de hacer una correcta distribución del producto. Se recomienda el uso de equipos especializados para tratamiento de semillas por el sistema en húmedo o slurry, asegurándose una correcta cobertura en toda la semilla. Dejar orear hasta que haya secado el producto y proceder a sembrar la totalidad de la semilla de inmediato.
No efectuar el llenado con agua de la maquinarias de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales. El mismo deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.

ALMACENAMIENTO Y PPREPARACION



CUIDADO



APLICACION