

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica: CLASE III (TRES) LIGERAMENTE PELIGROSO. IPCS/OMS, 2009

Antídotos: No tiene

Primeros Auxilios: En caso de ingestión no provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos lavado con agua limpia abundante durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel: lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado".

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros. Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Aves: moderadamente tóxico - **Peces:** altamente tóxico - **Abejas:** ligeramente tóxico
Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces.

En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. No dejar semilla tratada con éste producto expuesta a ser consumida por animales domésticos o silvestres.

Disposición final de envases. Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Trasladar los envases con triple lavado al centro de recolección mas cercano.

"Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas".
"En caso de intoxicación llamar al CIAT Tel.:1722 desde Montevideo y área metropolitana y 21722 desde el interior del país. Concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase" **"No transportar ni almacenar con alimentos."**

"No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua".

Art 49. " No debe usarse para tratar granos destinados a la alimentación humana o animal, ni para industrialización". "El lavado no elimina el tóxico de la semilla tratada".

ENVION INVIERNO S.C.

FUNGICIDA CURASEMILLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

PRINCIPIO ACTIVO	Porcentaje en peso	Concentración
IPRODIONE	8,41%	100 g/l
THIRAM	16,82%	200 g/l
CARBENZADIM	16,82%	200 g/l

Grupo químico: al que pertenece el ingrediente activo Iprodione: Dicarboximida
Thiram: Dimetiltiocarbamato. Carbendazim: Bencimidazol

Número de Registro: DGSA/MGAP: 3483

Número del lote o partida:

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

Empresa formuladora: ENZUR S.A.

Formulación nacional - País de origen Uruguay



ruta 101 Km 23,500 - CANELONES - URUGUAY

Tel/Fax: 2683 8989* / calister@calister.com.uy

www.calister.com.uy

Servicio de Atención al Cliente 0800-1827

AGITAR ANTES DE USAR Cont. **20** Litros **USO AGRÍCOLA**
Neto:

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Lea atentamente la etiqueta (y el folleto adjunto -si existe-) antes de usar el producto.

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en esta etiqueta.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, protegido de la luz solar directa, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares, el local debe estar claramente señalizado.

RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo e instrucciones de uso: ENVION INVIERNO SC es un curasemilla formulado en base a tres ingredientes activos para ampliar el espectro de patógenos controlados. Posee acción de contacto y sistémica. El Iprodione tiene como función reforzar el poder curasemillas para el control de las enfermedades de la cebada indicadas en esta etiqueta y el control de mancha amarilla del trigo.

Cultivo	Nombre común	Nombre científico	Dosis cc/100 Kg de semillas
Cebada	Mancha en red	Drechslera teres	200 a 250
Cebada	Mancha borrosa	Bipolaris sorokiniana	200 a 250
Trigo	Mancha amarilla	Drechslera tritici-repentis	200 a 250
Trigo	Carbón volador	Ustilago tritici	200 a 250
Trigo	Carbón hediendo	Tilletia foetida	200 a 250
Trigo-Cebada	Podredumbre de plantulas	Fusarium graminearum	200 a 250
Arroz	Enfermedades de semilla	Fusarium sp.	200 a 250

Momento(s) de aplicación: Aplicar en la semilla a ser cultivada previo a la siembra.

Número, frecuencia, y espaciamiento de aplicaciones: Una sola vez.

Compatibilidad y Fitotoxicidad: Se aplica solo, a la semilla, aunque puede ser aplicado en combinación con insecticidas recomendados para la aplicación en los cultivos de trigo y cebada. En caso de duda, efectuar una prueba previa a la aplicación, en pequeña escala, para probar su compatibilidad con otro fitosanitario como asimismo su fitocompatibilidad.

Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto con el cual se combine. Si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla.

Tiempo de espera: No corresponde. **Tiempo de reingreso al cultivo:** No corresponde.

Otras informaciones NECESARIAS respecto al uso: Cuando fungicidas de un mismo modo de acción, son usados repetidamente en las mismas zonas o sobre el mismo cultivo, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicha zona o cultivo. Alternar o combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferente modo de acción, pueden evitar o demorar la aparición o el desarrollo de resistencia.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Agitar el envase antes de su utilización. Diluir el producto en una cantidad de agua mínima para lograr una buena cobertura de la semilla a tratar (1,5 a 2 lts. en total cada 100 kg de semilla). Se puede aplicar con máquinas de uso frecuente en el tratamiento de semillas, máquina tipo hormigonera, tambor curador con eje excéntrico y tratamiento continuo.

En caso de tener que aplicar inoculante, aplicar primero ENVION INVIERNO SC y luego el inoculante. No se recomienda la premezcla de los productos. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto con el cual se combine: Prohibido el llenado con agua de las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedarios. El agua del lavado de la máquina deberá verse en el sitio donde se sembrará el cultivo.

NOTA: Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera del control de esta firma, esta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por entendido, que el comprador ha aceptado estas condiciones.



CUIDADO