

INHQUIT 48 S.C.

APTITUD: INSECTICIDA

MODO DE APLICACIÓN: Agitar bien el envase antes de abrirlo. Poner agua limpia en el tanque de la pulverizadora aproximadamente hasta la mitad. Agregar la cantidad de INHQUIT 48 S.C. calculada según la dosis a aplicar y el gasto que el equipo hace por hectárea. Completar con agua hasta el volumen calculado. Mantener el agitador en movimiento durante la operación.

METODO DE APLICACION: Con equipos pulverizadores terrestres de uso común, usar volúmenes de caldo por hectárea que aseguren una buena cobertura del follaje. No usar menos de 40 l. por há en aplicaciones aéreas.

La cobertura debe ser al menos de 70 gotas por cm². No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o sub urbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana, o suburbana y centro poblado.

EPOCA DE APLICACIÓN: En todos los cultivos, cuando se observe la presencia de adultos de la plaga, en la oviposición o apenas eclosionados los huevos.

DOSIS: Ver tabla por cultivo y plaga.

FRECUENCIA DE APLICACION Y TIEMPO DE ESPERA:

Tiempo de espera : 30 días en todos los cultivos.

COMPATIBILIDADES: Es compatible con insecticidas y fungicidas de reacción neutra. En caso de duda, realizar una prueba en pequeña escala.

PRECAUCIONES, INDICACIONES DE VENENO Y ANTIDOTO:

No tiene antidoto.

ESCALA DE TOXICIDAD: IV (cuatro)

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE: 0800 - 1827



LABORATORIO CALISTER S.A.

PRINCIPIO ACTIVO

	PORCENTAJE EN PESO	CONCENTRACION EN VOLUMEN
TRIFLUMURON	39,7	480 g/l.

FORMULACION: SUSPENSION CONCENTRADA

GENERALIDADES E INSTRUCCIONES DE USO: es un insecticida que actúa principalmente por ingestión. Su acción inhibe la síntesis de quitina, por lo que el insecto no prosigue con su desarrollo. Por ello, los tratamientos deben hacerse durante la oviposición o la eclosión de las larvas.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS
Tomate	Nombre común Polilla del tomate Nombre científico Scrobipalpula absoluta	50 ml. / 100 l. agua
Soja	Polilla de la papa Phthorimaea operculella	20 ml. / 100 l. agua
Trigo y cebada	Lagarta de la soja Anticarsia gemmatalis	50 ml. /há
	Lagarta de los cereales Pseudaletia adultera	50 ml. /há



Empresa registrante:
CALISTER S.A.

Dorado (ex. Oficial 2) Nº 84 - Aeropuerto de Carrasco
Canelones - Uruguay

Tel.: (598-2) 600 9903* / Fax: (598-2) 604 5879

E-mail: calister@calister.com.uy / www.calister.com.uy



NOTA: La firma registrante garantiza la calidad de este producto. Como su uso, manejo y almacenamiento se realizan fuera del control de la misma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del almacenamiento, transporte y empleo de este producto. El comprador asume todos los riesgos derivados de su uso y manejo, quedando por entendido que ha aceptado estas condiciones.

LEA LA ETIQUETA

MEDIDAS A TOMAR COMO PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico.
 - En caso de ingestión no provocar el vómito.
 - En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.
 - En caso de contacto con los ojos lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.
 - En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.
 - En todos los casos consultar al médico llevando la etiqueta o el envase del producto.
- Consultar al CIAT (Hospital de Clínicas, 7mo. piso) Tel. 1722**

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y DESTRUCCION DE ENVASES

- Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
- Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
- Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.
- Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.
- Guardar el producto en su envase original, etiquetado, en lugar fresco y seco, evitando la luz directa del sol.
- No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
- No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.
- No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación.
- Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. (Luego perfóre el envase para evitar su reutilización)

"Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales"
"No almacene con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas"

Toxicidad para abejas : no tóxico

Fecha de vencimiento: MAYO 2008

Fabricación Extranjera

Venta autorizada por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca
Registro D.G.S.A. Nº 3028

USO AGRICOLA

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta

Contenido Neto
1Litro



GUIDADO

