

FLUDIOX FORTE

FUNGICIDA CURASEMILLA

SUSPENSION CONCENTRADA

NOMBRE COMUN DEL INGREDIENTE ACTIVO	Porcentaje en peso %	Contenido en volumen
FLUDIOXONIL	2,21	25 g/l
METALAXYL	19,91	225 g/l

Grupo químico al que pertenecen los ingredientes activos: Fludioxonil - Fenilpirroles, Metalaxil - Fenilamidas

Número de Registro: **4178**

Número del lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

Formulador: ENZUR S.A. - Industria Uruguaya

Venta autorizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta

AGITAR ANTES DE USAR

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno" (con símbolo de calavera).

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTAS.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

Art. 49 - No debe usarse para tratar granos destinados a la alimentación humana o animal, ni para industrialización. EL LAVADO NO ELIMINA EL TÓXICO DE LA SEMILLA TRATADA.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN SU USO NORMAL. IPCS/OMS, 2009

Antídotos: No tiene

Primeros auxilios: En caso de ingestión NO provocar el vómito.

En caso de contacto con la piel, lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.

En caso de contacto con los ojos, hacer lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT telef. 1722 desde Montevideo y zona Meropolitana y 21722 desde el resto del país. Concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.

Empresa registrante: **CALISTER S.A.**
 **CALISTER**

RUTA 101 Km 23,500 - CANELONES - URUGUAY

Telefax: 2683 8989*

calister@calister.com.uy / www.calister.com.uy

Servicio de Atención al Cliente 0800-1827

Calister S.A. es una empresa con su Sistema de Gestión de Calidad (SGC) certificado según normas ISO 9001:2008. El mismo abarca la totalidad de los procesos y servicios.

USO AGRÍCOLA

Cont. **5** litros
Neto:



CUIDADO



Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

No pulverizar contra el viento.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Por su forma de uso no ofrece peligro, sin embargo debe considerarse que es un producto moderadamente tóxico para peces; y ligeramente tóxico para aves y abejas.

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces. No dejar semillas tratadas al alcance de animales domésticos o silvestres.

En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en envases adecuados, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.

Disposición final de envases:

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" volcando el líquido resultante en el sitio donde se sembrará el cultivo. Luego perfure el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de acopio más cercano.

RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: FLUDIOX FORTE es un curasemilla fungicida para el tratamiento de semillas de soja, que contiene una mezcla de dos ingredientes activos, lo que le proporciona un amplio espectro de control. Tiene acción de contacto, dada por el Fludioxonil, que interfiere en la germinación de las esporas de los hongos y también acción sistémica, dada por el Metalaxil, que es absorbido por la plántula e inhibe el crecimiento de las hifas de los hongos en el tejido. Controla hongos de semillas, hongos de la plántula y hongos del suelo.

Compatibilidad y fitotoxicidad:

Si fuera necesario el uso de un curasemilla insecticida, consultar con un Ingeniero Agrónomo. Es compatible con inoculantes para soja, respetando las indicaciones de uso de las etiquetas de los inoculantes. Inocular la semilla posteriormente a la aplicación del Curasemilla. No es fitotóxico aplicado como se indica.

Tiempo de espera: No corresponde.

Tiempo de reingreso al cultivo: No corresponde.

Modo de preparación y técnica de aplicación:

Se aplica directamente a la semilla, diluido en una cantidad suficiente de agua de tal forma de hacer una correcta distribución del producto. No utilizar más de 1,5 litros de dilución total (producto + agua) por cada 100 kilos de semilla. Se recomienda el uso de equipos especializados para tratamiento de semillas por el sistema en húmedo o slurry asegurándose una correcta cobertura en toda la semilla. Agitar antes de usar. No efectuar el llenado con agua de las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales. El mismo deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

El agua de lavado de los equipos de aplicación deberá volcarse en el lugar donde se sembrará la semilla tratada.

Nota: La firma registrante garantiza la calidad de este producto. Como su uso, almacenamiento y transporte se hacen fuera del control de la misma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse de los mismos. El comprador asume la responsabilidad por ellos, y declara conocer y haber leído esta etiqueta. El texto de esta etiqueta ha sido aprobado por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

Cultivo	Enfermedad		Dosis ml cada 100 kg. semilla
	Nombre Común	Nombre Científico	
SOJA	Mal de almácigos	Fusarium spp Pythium spp Phytophthora spp. Rhizoctonia spp Alternaria spp	100
	Tizón del tallo y vainas	Complejo Diaporthe/Phomopsis	
	Mancha púrpura	Cercospora kikuchii	
	Alternaria	Alternaria spp	
	Mohos, hongos de almacenamiento	Aspergillus spp. Penicillium spp	

Momento(s) de aplicación: Previo a la siembra.

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde:

Una aplicación a la semilla previamente a la siembra.



CUIDADO

