

CUADRIGA 45 FS

FUNGICIDA CURASEMILLAS

SUSPENSIÓN
CONCENTRADA
PARA TRATAMIENTO
DE SEMILLAS

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso	Contenido en volumen
Iprodione	21,7 %	250 g/ L
Carbendazim	10,9 %	125 g/ L
Azoxistrobin	4,4 %	50 g/ L
Protiocanazol	2,2 %	25 g/ L

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Iprodione: Carboxamida; Carbendazim: Bencimidazol; Azoxistrobin: Estrobilurina; Protiocanazol: Triazol

Número de Registro: 4808

Número del lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

Formulador: ENZUR S.A. - Industria Uruguaya

Venta autorizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca



Empresa registrante: **CALISTER S.A.**

CALISTER

ruta 101 Km 23,500 - CANELONES - URUGUAY / Telefax: 2683 8989*

calister@calister.com.uy / www.calister.com.uy

Servicio de Atención al Cliente 0800-1827

Calister S.A. es una empresa con su Sistema de Gestión de Calidad (SGC) certificado según normas ISO 9001:2008. El mismo abarca la totalidad de los procesos y servicios.

**AGITAR ANTES
DE USAR**

Cont. **5** litros
Neto:

USO AGRÍCOLA

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno (calavera)".

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTAS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

Art. 49 - No debe usarse para tratar granos destinados a la alimentación humana o animal, ni para industrialización. EL LAVADO NO ELIMINA EL TÓXICO DE LA SEMILLA TRATADA.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN SU USO NORMAL. IPCS/OMS, 2009

Antídotos: No tiene

Primeros auxilios: En caso de ingestión: NO provocar el vómito.

En caso de contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.

En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT telef. 1722 desde Montevideo y zona Metropolitana y 21722 desde el resto del país. Concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.



CUIDADO



Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

"PROHIBIDO SU USO PARA TRATAR GRANOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN HUMANA O ANIMAL O PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN". El lavado no elimina el tóxico de la semilla tratada".

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: Por su forma de uso no ofrece peligro, sin embargo

debe considerarse que es un producto poco tóxico para aves, muy tóxico para peces y ligeramente tóxico para abejas.

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces. No dejar semillas tratadas al alcance de animales domésticos o silvestres.

"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en envases adecuados, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.

Disposición final de envases:

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfora el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección y acopio más cercano.

RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

CUADRIGA 45 FS es un fungicida curasemilla formulado en base a cuatro ingredientes activos de diferentes familias químicas para ampliar el espectro de patógenos controlados, incrementar su acción fungicida y reducir los riesgos de generar resistencia en los patógenos. Controla varias enfermedades en trigo y cebada, siendo particularmente efectivo para el control del género *Pyrenophora*.

Instrucciones de uso:

Cultivo	Enfermedad		Dosis ml cada 100 kg. semilla
	Nombre Común	Nombre Científico	
Cebada	Mancha en Red	<i>Pyrenophora teres</i>	200
	Mancha Borrosa	<i>Bipolares sorokiniana</i>	
Trigo	Mancha Amarilla	<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>	
	Alternaria	<i>Alternaria spp</i>	
Trigo Cebada	Podredumbre de Plántulas	<i>Fusarium graminearum</i>	

Momento(s) de aplicación, número, frecuencia, o espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Aplicar una vez a la semilla, previo a la siembra.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Se aplica solo, a la semilla, aunque puede ser combinado con insecticidas recomendados para la aplicación en los cultivos de trigo y cebada. En caso de duda, efectuar una prueba previa a la aplicación, en pequeña

escala, para comprobar su compatibilidad químico - física con otro fitosanitario como asimismo su fitocompatibilidad. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto con el cual se combine. Si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla.

Tiempo de espera: No corresponde por el momento de aplicación.

Tiempo de reingreso al cultivo: No se aplica dado el método de tratamiento indicado.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Agitarse enérgicamente el envase antes de su utilización. Diluir la dosis indicada de CUADRIGA 45 FS en aproximadamente 0,5 - 1,0 litro de agua por cada 100 Kg. de semilla, teniendo en cuenta que la cantidad de caldo a utilizar dependerá del tipo de equipo con que se cure, tipo de semilla y las condiciones en que ésta se encuentre (limpieza, pureza, etc.). Para lograr un resultado adecuado, se debe aplicar con los equipos existentes en plaza para curar semillas a método húmedo.

Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. El agua de lavado de la máquina se debe volcar en el sitio donde se va a sembrar el cultivo.

Nota: La firma registrante garantiza la calidad de este producto. Como su uso, almacenamiento y transporte se hacen fuera del control de la misma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse de los mismos. El comprador asume la responsabilidad por ellos, y declara conocer y haber leído esta etiqueta. El texto de esta etiqueta ha sido aprobado por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.



CUIDADO

