

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL (IPCS/OMS 2009)

Antídoto: No tiene antídoto.

Primeros auxilios:

- En caso de ingestión: NO provocar el vómito.
- Contacto con la piel: Quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con abundante agua.
- Contacto con los ojos: Lavado ocular con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.
- En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT, TELÉFONO (2)1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA O FOLLETO O EL ENVASE.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.

No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua con restos del producto.

Toxicidad para aves: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO

Toxicidad para peces: LIGERAMENTE TÓXICO

Toxicidad para abejas: MODERADAMENTE TÓXICO. Pero por la forma en que se aplica (tratamiento de las semillas) no representa riesgo.

"Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar."

NO DEJAR SEMILLA TRATADA CON ESTE PRODUCTO EXPUESTA A SER CONSUMIDA POR ANIMALES DOMÉSTICOS O SILVESTRES PRINCIPALMENTE AVES.

Disposición final de envases:

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en un lugar especial del campo donde no pueda contaminar aguas superficiales, personas o animales. Luego perforo el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES.

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTAS".

"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

"PROHIBIDO SU USO PARA TRATAR GRANOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN HUMANA O ANIMAL O PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN. El lavado no elimina el tóxico de la semilla tratada".

EVITAR 625 FS

CURASEMILLA - INSECTICIDA

Formulación: Suspensión concentrada para tratamiento de semillas

Composición:

NOMBRE COMUN DEL INGREDIENTE ACTIVO	Porcentaje en peso %	Contenido en volumen
Clorantraniliprole	49,2	625 g/l

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Diamidas Antranilicas

Registro DGSA / MGAP N°: 5112

Número del lote o partida:

Fecha de fabricación del producto:

Fecha de vencimiento:

Formulador: **Enzur S.A.** / País de origen Uruguay

Cont. Neto **1lt.**

USO AGRÍCOLA

Empresa registrante: **CALISTER S.A.**
CALISTER

ruta 101 Km 23,500 - Canelones Uruguay - Tel/Fax: 2683 8989*
calister@calister.com.uy / www.calister.com.uy

Servicio de Atención al Cliente 0800-1827

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".

Venta autorizada por el
Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca

**PROHIBIDO SU USO DISTINTO A LOS
ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA**



RECOMENDACIONES DE USO

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

Actúa por contacto e ingestión y tiene un prolongado efecto residual. Posee buena sistemia en la planta. Pertenece a la familia química de las diamidas antranilicas y actúa como activador de los receptores de rianodina de los insectos, afectando la contracción muscular en los mismos. Los insectos afectados muestran parálisis, dejan de alimentarse y mueren entre 24 y 72 horas después.

Instrucciones de uso:

Cultivo o sitio de aplicación	Plaga		Dosis (ml/100 kg semilla)
	Nombre Común	Nombre Científico	
Soja	Lagarta spodoptera	<i>Spodoptera cosmioides</i>	40 - 60
Maíz	Lagarta cogollera	<i>Spodoptera frugiperda</i>	120
	Lagarta spodoptera	<i>Spodoptera cosmioides</i>	
Sorgo	Lagarta cortadora	<i>Agrotis ipsilon</i>	95 - 120
	Lagarta cortadora	<i>Agrotis ipsilon</i>	

Momento(s) de aplicación: aplicación a la semilla. Previo a la siembra.

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: no corresponde

Compatibilidad y fitotoxicidad: No afecta la sobrevivencia de Bradyrhizobium en condiciones normales de uso del inoculante.

Es compatible con la mayoría de los productos utilizados como curasemilla. Lea y observe las directivas de los productos mezclados, incluyendo dosis, restricciones, etc. Siga la recomendación más estricta que aparezca en las etiquetas para mezclar, cargar y aplicar la mezcla de productos. El tratamiento de semillas dañadas, con poca calidad o poco vigor puede resultar en germinación reducida.

Tiempo de espera: No corresponde.

Tiempo de reingreso al cultivo: No corresponde.

Otras informaciones NECESARIAS respecto al uso:

Cualquier información que complete el conocimiento del modelo de uso.

La semilla deberá sembrarse lo más próximo posible a la fecha de curado.

No realizar ninguna aplicación de un insecticida del grupo 28 por un mínimo de 60 días después de plantada la semilla tratada con **EVITAR 625**, para evitar la aparición de resistencia. En caso de requerirse una aplicación foliar durante este período ventana, debe ser hecha con un insecticida de otro grupo.

No efectuar el llenado de la maquinaria de aplicación con agua directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

Nota: La firma registrante garantiza la calidad de este producto. Como su uso, almacenamiento y transporte se hacen fuera del control de la misma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse de los mismos. El comprador asume la responsabilidad por ellos, y declara conocer y haber leído esta etiqueta. El texto de esta etiqueta ha sido aprobado por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.



CUIDADO